

Kanin hidastunut suolistotoiminta – mitä tehdä?

Kani makoilee ja näyttää kipuilevalta? Ei syö eikä papanoi? Saattaa virtsata alleen?

Kani ei syö, jos sattuu ja jos kani ei syö, ei tule papanaakaan. Hidastunut suolistotoiminta on vakava tila eläinlajeilla, jotka eivät osaa oksentaa. Se on yleensä oire, joka voi johtua monista, kiireellistäkin hoitoa vaativista sairauksista. Tämän vuoksi eläinlääkärintarkastus on paikallaan.

Milloin eläinlääkəriin?

- jos kani ei syö mitään itse
- jos kani muuttuu apaattiseksi
- jos kani on selkeästi ylipainoinen (hengenvaarallinen rasvamaksa kehittyy nopeammin ylipainoisilla syömättömillä kaneilla)
- jos kani on alilämpöinen (tuntuu viileältä, etenkin varpaista ja korvista)
- eläinlääkəriillä kani tutkitaan, se saa nesteytystä, kipulääkettä ja suolistotoimintaa edistävää lääkettä

Kotihoitona (kun kani on melko pirteä tai kani on jo saanut eläinlääkəriin hoitoa):

- persiljaa tai muita kanin lempiyrttejä (houkuttele syömään viemällä lehtiä kanin huulille)
- lämpöhoitoa (infrapunalamppu tai vastaava, mutta pidä huoli ettei lämpötila nouse liikaa)
- kevyttä vatsahierontaa
- mahdollisesti tukiruokintaa (kasvinsyöjien Recovery/Critical care -jauhetta veteen sekoitettuna pakkauksen ohjeen mukaan. Jos ei jauhetta ole, turvota pellettejä vedessä tai käytä sokeroimatonta kurpitsasosetta 50 ml/kg jaettuna kolmeen tai viiteen ruokintakertaan päivässä. Soseeseen lisätään tilkka vettä tai 1 tl rypsiöljyä.)
- kaikilla ei ole eläinlääkəriin palveluita lähellä, joten on hyvä aloittaa kotihoito eläinlääkəriin pääsyä odotellessa. Älä kuitenkaan kokeile tukiruokintaa, jos kani on jo apaattinen.

Aiemmin on ollut vallalla käsitys, jonka mukaan kanin hidastuneeseen suolistotoimintaan on hyvä antaa ananasta tai papaijaa. Niissä on kuitenkin korkea sokeriipitoisuus, mikä monesti aiheuttaa löysää vatsaa eikä papaiinin tai bromelaiinin tehosta ole tieteellisiä todisteita.

Ananassäilykemehun antaminen voi näennäisesti parantaa kanin oloa, mutta siinä on kyse nimenomaan nesteen antamisesta eikä niinkään siitä, mitä nestettä annetaan. Anna siis mieluummin ruutalla pelkkää vettä. Aikuisen kanin mahalaukun pH on yleensä 1-2, joten mahalaukun happamuuden takia vaikutus ei ulotu suolistoon saakka. Happamuus heikentää ananaksen tehon eikä papaija toimi sen paremmin.

Ennaltaehkäisyyn:

- vapaa liikunta
- oikea ravinto (heinä, pelletti siemenseoksen sijaan, yrttejä yms.)
- ei äkillisiä muutoksia ruokavalioon tai muihin oloihin
- suotuisa elinympäristö (piiloutumis- ja kaivamismahdollisuuksia, lajitovereita yms.)

HUOM! Jos päivystyksessä ei ole saatavilla kaneihin perehtynyttä eläinlääkəriä, Yliopistollisessa Eläinsairaalassa on koko maan eläinlääkäreitä palveleva konsultaatiopuhelin 24/7.

Yhteistyössä:

Kanikirjailija **Sari Mäyränpää** & Yliopistollisen Eläinsairaalan Eksoottisten eläinten klinikka

Lisätiedot www.sarinarkki.fi & <http://elainsairaala.helsinki.fi/fi/eksoottisten-elainten-klinikka>